

نکات :

- ۱- کود آلی گوگردی پریاس شیمی در زمان استفاده به هیچ عنوان با کود و سمی دیگری مخلوط نگردد
- ۲- بهترین زمان محلول پاشی دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد  
ترجیحاً عصر میباشد
- ۳- بهترین زمان محلول پاشی باغ و یا مزرعه بعد از آبیاری میباشد



PARIYAS CHIMI  
**پریاس**  
کود گوگرد آلی مایع

[www.mehrabantrade.com](http://www.mehrabantrade.com)



## برنامه غذایی گوجه فرنگی

زمان مصرف	نحوه استفاده	میزان مصرف(در هکتار)
قبل از کشت	خاکی	گوگرد گرانول ۴۰۰ کیلو
پس از استقرار کامل نشا	آبیاری	۱۰ لیتر
مراحل اولیه رشد	محلولپاشی/آبیاری	۳ در هزار ۱۰ لیتر آبیاری
قبل از گلدهی	محلولپاشی	۳ در هزار
رشد میوه، رنگ انداختن میوه	محلولپاشی	۳ در هزار



## برنامه غذایی غلات

زمان مصرف(در هکتار)	نحوه استفاده	میزان مصرف(در هکتار)
قبل از کشت	حاکی	گوگرد گرانول بنتونیت دار ۴۰۰ کیلو
جوانه زنی	آبیاری	۱۰ لیتر
پنجه زنی	محلولپاشی/آبیاری	۳ در هزار ۱۰ لیتر آبیاری
ساقه رفتن	محلولپاشی/آبیاری	۳ در هزار ۱۰ لیتر آبیاری
ظهرور خوشة	آبیاری	۱۰ لیتر



## برنامه غذایی فلفل

میزان مصرف(هکتار)	نحوه استفاده	زمان مصرف
۴۰۰ کیلوگرم	خاکی(گوگرد گرانول)	قبل از کشت
۱۰ لیتر	آبیاری	یک هفته بعد از انتقال نشا
۳ در هزار ۱۰ لیتر آبیاری	محلولپاشی/آبیاری	۶-۸ برگی
۳ در هزار	محلولپاشی	قبل از گلدھی
۳ در هزار	محلولپاشی	رشد اولیه میوه



## برنامه غذایی انگور

میزان مصرف(در هکتار)	نحوه استفاده	زمان مصرف
گوگرد گرانول بنتونیت دار ۴۰۰ کیلو	خاکی	قبل از کشت
۱۰ لیتر	آبیاری	پس از باز شدن کامل برگ ها
۳ در هزار	محلول پاشی	قبل از گلدهی
۳ در هزار ۱۰ لیتر آبیاری	م محلول پاشی / آبیاری	ظهرور خوشه میوه
۳ لیتر ۱۰ لیتر آبیاری	م محلول پاشی / آبیاری	غوره شدن
۱۰ لیتر	آبیاری	سه هفته قبل از رسیدن



## برنامه غذایی سیب زمینی

میزان مصرف ( هکتار)	نحوه استفاده	زمان مصرف
۴۰۰ کیلوگرم	خاکی(استفاده از گوگرد گرانول) بنتونیت دار	قبل از کشت
۳ درهزار ۱۰ لیترهمراه با آبیاری	محلولپاشی / آبیاری	مرحله ۵ برگی
۳ درهزار ۱۰ لیترهمراه با آبیاری	محلولپاشی / آبیاری	قبل از گلدهی
۳ درهزار	محلولپاشی	شروع غده بندی
۱۰ لیتردرهکتار	آبیاری	پایان گلدهی تا ۱۵ روز قبل از برداشت



## برنامه غذایی زعفران

زمان مصرف	نحوه استفاده	میزان مصرف(هکتار)
قبل از کشت	خاکی(گوگردگرانول)	۴۰۰ کیلو
آبیاری اول	آبیاری	۱۰ لیتر
بعداز برداشت گل	آبیاری	۱۰ لیتر
نیمه اول بهمن	محلولپاشی	۵ درهزار
نیمه اول اسفند	محلولپاشی	۵ درهزار



برنامه غذایی خیار		
میزان مصرف(هکتار)	نحوه استفاده	زمان مصرف
۴۰۰ کیلو	خاکی(گوگردگرانول)	قبل از کشت
۳ در هزار ۱۰ لیتر همراه با آبیاری	محلولپاشی / آبیاری	مرحله ۳-۴ برگی
۳ در هزار ۱۰ لیتر همراه با آبیاری	محلولپاشی / آبیاری	مرحله ۴-۸ برگی
۳ در هزار	محلولپاشی	قبل از گلدهی
۳ در هزار	محلولپاشی	بعداز تشکیل میوه
۱۰ لیتر	آبیاری	پس از اولین برداشت



برنامه غدایی یونجه		
میزان مصرف(در هکتار)	نحوه استفاده	زمان مصرف
۱۰ لیتر	آبیاری	آغاز رشد رویشی
۱۰ لیتر	آبیاری	بعد از برداشت هر چین
۳ در هزار	محلول پاشی	در صورت مشاهده آفت



برنامه تغذیه ذرت		
میزان مصرف(هکتار)	نحوه استفاده	زمان مصرف
۴۰۰ کیلو	خاکی(گوگردگرانول)	قبل از کاشت
۱۰ لیتر	آبیاری	مرحله ۳-۴ برگی
۳ در هزار ۱۰ لیتر آبیاری	محلولپاشی/آبیاری	مرحله ۶-۸ برگی
۱۰ در هزار	محلولپاشی	قبل از ظهرورگل نر
۱۰ لیتر	آبیاری	ظهرورگل ماده
۱۰ لیتر	آبیاری	دانه بندی



## برنامه تغذیه درختان میوه هسته دار و دانه دار

میزان مصرف(هکتار)	نحوه استفاده	زمان مصرف
۴۰۰ کیلو	چالکود (گرانول)	زمستان(اسفند- فروردین)
۱۰ لیتر	آبیاری	بعد از ریزش ۸۰٪ گل ها
۵ درهزار ۱۰ لیتر آبیاری	محلولپاشی / آبیاری	فندقی شدن میوه
۳ درهزار ۱۰ لیتر آبیاری	محلولپاشی / آبیاری	قبل از برداشت (رسیدگی میوه)



برنامه تغذیه پسته		
میزان صرف(هکتار)	نحوه استفاده	زمان مصرف
۴۰۰ کیلو	چالکود (گرانول)	زمستان
۵ در هزار ۱۰ لیتر آبیاری	محلولپاشی/آبیاری محلول پاشی هر ۱۵ روز یکبار	رشدرویشی
۱۰ لیتر	آبیاری	تشکیل مغز
۳ در هزار	محلولپاشی	شروع رسیدگی میوه



برنامه تغذیه مرکبات		
میزان مصرف(هکتار)	نحوه استفاده	زمان مصرف
۴۰۰ کیلوگرم	چالکود (گوگرد بنتونیت دار)	زمستان (اسفند- فروردین)
۵ در هزار	محلولپاشی	قبل از شکوفه دهی
۱۰ لیتر - ۳ در هزار	آبیاری - محلول پاشی	تشکیل میوه
۳ در هزار ۱۰ لیتر آبیاری	محلولپاشی/آبیاری	درشت شدن میوه
۳ در هزار	محلولپاشی	رنگ پذیری میوه



برنامه تغذیه پنبه		
میزان مصرف(هکتار)	نحوه استفاده	زمان مصرف
۴۰۰ کیلوگرم	خاکی(گوگرد بنتونیت دار)	قبل از کشت
۱۰ لیتر	آبیاری	جوانه زنی
۳ درهزار محلولپاشی ۱۰ لیترآبیاری	محلولپاشی/آبیاری	رشد ساقه اصلی
۳ درهزار	محلولپاشی	قبل از گلدهی
۳ درهزار ۱۰ لیترآبیاری	محلولپاشی/آبیاری	رشدقوزه



برنامه تغذیه کلزا		
میزان مصرف(هکتار)	نحوه استفاده	زمان مصرف
۴۰۰ کیلوگرم	خاکی (گوگرد بنتونیت دار)	قبل از کاشت
۳ در هزار ۱۰ لیترابیاری	محلولپاشی /ابیاری	رشد رویشی
۱۰ لیتر	ابیاری	گل دادن
۱۰ لیتر	ابیاری	تشکیل غلاف
۳ درهزار ۱۰ لیتر ابیاری	محلولپاشی/ابیاری	شروع رسیدگی



برنامه تغذیه خرما		
میزان مصرف(هکتار)	نحوه استفاده	زمان مصرف
۴۰۰ کیلوگرم	چاکود(گرانول)	زمستان(بهمن-اسفند)
۵ درهزار ۱۰ الیترابیاری	محلولپاشی/ابیاری	قبل از گرده افشاری
۳ درهزار ۱۰ الیتر	محلولپاشی ابیاری	جبابک یا نخودی شدن کیمری یا فندقی شدن
۱۰ الیترابیاری	ابیاری	خلال یا خارک (مرحله شروع قرمز شدن)
۱۰ الیترابیاری	ابیاری	رطب (قهقهه ای شدن)



برنامه تغذیه چغندر		
میزان مصرف (هکتار)	نحوه استفاده	زمان مصرف
۴۰۰ کیلوگرم	خاکی (گوگرد بنتونیت دار)	قبل از کاشت
۳ در هزار لیتر ابیاری	محلولپاشی / ابیاری	۶-۴ برگی
۳ در هزار لیتر ابیاری	محلولپاشی	رشد رویشی
۳ در هزار لیتر ابیاری	محلولپاشی / ابیاری	تشکیل غده

